

今回の「医薬品適正使用・育薬トレーニング」の問題

一般調剤のリスクマネジメント

問題提出：平成 28 年 8 月 1 回目

問題解答：平成 28 年 8 月 2 回目

【処方の内容は？】

<処方 1> 76 歳の男性。病院の内科。オーダー/印字出力。5 月 11 日

セルベックス細粒 10% 1 g 1 日 2 回 朝夕食後 28 日分

【何が起こったか？】

セルベックス細粒 10% の 1 包は「1 g」（実際は 0.5 g）と思い込み、56 包のところ 28 包しか集薬せず、患者に交付してしまった。

【どのような経緯で起こったか？】

5 月 11 日、患者は夕方に処方せんを持って来局した。薬剤師は、処方 1 の薬剤を調剤し、患者に交付した。

5 月 21 日の午前に、患者から電話があり、セルベックス細粒 10% が 28 包（14 日分）少ないと指摘された。薬局での実在庫と理論在庫をチェックしたところ 28 包多く残っており、誤って少なく交付したことが判明した。当日中に少なかった薬剤を患者宅に届けて、深く謝罪した。

患者は、薬剤を用法用量通り服用していた。薬が足りなくなって直ぐに連絡したため服薬できないということはなく、患者の病状にも特に変わったことはなかった。

【指導薬剤師から一言】 難易度 ★☆☆☆☆

細粒・顆粒・散剤の分包品の一包当たりの g 数の知識があやふやな場合の危険性を考える。